

AUFKLÄRUNGSBOGEN KONTRASTMITTEL MRT

In manchen Fällen ist es notwendig, Kontrastmittel über eine Vene in das Blutgefäßsystem einzuspritzen, um aussagekräftigere Bilder und Befunde zu erhalten.

IST MIT KOMPLIKATIONEN ZU RECHNEN?

Die verabreichten Kontrastmittel werden normalerweise sehr gut vertragen. Dennoch können sie in Einzelfällen während oder auch kurz nach der Untersuchung zu Komplikationen führen.

- **Extrem selten:** Haut-, Weichteil- und Nervenschäden (z. B. Spritzenabszess, Absterben von Gewebe, Venenreizung) infolge von Einspritzungen, die medikamentös oder operativ behandelt werden müssen und u. U. lang an dauernde oder dauerhafte Beschwerden (Narben, Taubheitsgefühle, Schmerzen) zur Folge haben können;
- **Sehr selten:** Überempfindlichkeitsreaktionen auf das Kontrastmittel (z.B. Brechreiz, Juckreiz, Hautausschlag), die meist von selbst wieder abklingen. Schwere Allergien mit Schleimhautschwellung im Kehlkopf, Herz-/Kreislauf versagen, Atemstörungen und Krämpfen sind extrem selten, erfordern aber eine intensivmedizinische Behandlung und können u. U. lebensbedrohlich sein oder infolge Mangel durchblutung zu bleibenden Organschäden (Nierenversagen, Hirnschädigung mit Krampfanfällen) führen;
- **Extrem selten:** kann es im Falle einer Kontrastmittelgabe bei schon vorab bestehenden Störungen der Niere zu einer Einschränkung (bis hin zum Versagen) der Nierentätigkeit kommen. In den meisten Fällen sind diese Störungen durch Infusionen bzw. Medikamente behandelbar. In Einzelfällen kann bei Nierenschaden dabei auch eine lebenslange Dialysebehandlung nötig werden.

DAHER IST FÜR EINE KONTRASTMITTELINJEKTION STETS EIN NEUER KREATININWERT NÖTIG

Im Falle einer Schwangerschaft besteht das Risiko einer Schädigung des ungeborenen Kindes durch die Untersuchung. Teilen Sie deshalb bitte dem Arzt unbedingt mit, falls Sie schwanger sind, oder auch nur den Verdacht hegen! Teilen Sie dem Arzt bitte auch mit, wenn Sie ihr Kind stillen!

WORAUF IST ZU ACHTEN?

- Falls nicht anders angeordnet, sollten Sie nach einer Untersuchung mit Kontrastmittel viel trinken, um die Ausscheidung des Kontrastmittels zu beschleunigen.
- Sollten noch am Untersuchungstag oder in den darauf folgenden Tagen plötzlich Juckreiz, Niesreiz, Schmerzen, Übelkeit, Durchfall oder andere körperliche Symptome auftreten, informieren Sie bitte sofort Ihren Arzt!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Gerätepersonal oder den behandelnden Arzt.